

Date :

**Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTIION EXONERANTE)**

Cher Confrère,
Merci de réaliser une IRM chez

Indication

Suivi trimestriel d'un traitement par TYSABRI® pour une sclérose en plaques.
Suivi renforcé au-delà de 2 ans de traitement
pour dépistage de leuco-encéphalopathie multifocale progressive.

Protocole OFSEP réduit : séquences 3D FLAIR et Diffusion (avec ADC)

IRM cérébrale

Protocole OFSEP réduit

- 3D FLAIR millimétrique
- DWI axiale + dADC

- 3D T1 millimétrique
- 3D T1 gadolinium* millimétrique
- 2D TSE DP/T2 axiale ou 3D T2
- DTI ≥ 15 directions
- 2D T2 EG
- SWI
- 3D DIR
- Autre :

IRM médullaire

- T2 sagittale
- T1 sagittale gadolinium*
- T2 EG axiale
- T1 axiale gadolinium*
- STIR sagittale
- Autre :

Très cordialement,

Neurologue

L'injection de produit de contraste au gadolinium* est fortement recommandée dans les cas suivants :

- au diagnostic ou au début du suivi (si IRM antérieure non disponible ou non conforme au protocole),
- à l'initialisation d'un de traitement de fond,
- six mois après une initialisation de traitement de fond.

Elle est recommandée en cas de poussée, et optionnelle pour rechercher une activité en vue d'une indication thérapeutique.

*Conformément aux suggestions émises par l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et l'European Medicines Agency, l'OFSEP recommande l'utilisation de gadolinium macrocyclique.



Contacts OFSEP

Questions techniques : imagerie@ofsep.org

Questions médicales : Pr François COTTON francois.cotton@chu-lyon.fr

Le code d'identification du médecin doit toujours être complété.
À défaut, la Caisse de votre patient ne peut procéder au remboursement.

L 3321